Oceanite tempete Hydrobates pelagicus

Soumis par Eric GARLETTI
04-07-2010

OcÃ©anite tempÃªte â€“ Hydrobates pelagicus

Famille : HydrobatidÃ©s
Nom vernaculaire : OcÃ©anite tempÃªte
Nom scientifique : Hydrobates pelagicus
SPAIN : Paino Europeo â€“ GB : European Storm-petrel
Longueur : 15 â€“ 16 cm
Envergure : 37 â€“ 41 cm
Poids : jusquâ€™Ã 28,5 g
Nourriture : petits poissons, mollusques cÃ©phalopodesâ€¦, et mÃªme dÃ©bris organiques gras.Â
LongÃ©vitÃ© : > 10 ans
Habitat : pÃ©lagique, frÃ©quente la haute mer et niche sur des Ã®lots.

Assez proches des puffins, les ocÃ©anites sont de tout petits oiseaux de mer gÃ©nÃ©ralement sombres. Il est parfois difficile de les dÃ©tecter sur une mer agitÃ©e, car ils disparaissent souvent derriÃ¨re les vagues. Dâ€™un vol lÃ©ger, lâ€™OcÃ©anite parcoure la surface de lâ€™eau, se posant et redÃ©collant aussitÃ´t, alternant battements dâ€™ailes rappelant une chauve-sou et brefs planÃ©s. Sa petite taille et sa coloration, globalement noire avec un large croupion blanc,Â Ã©voquent lâ€™Hirondelle fenÃªtre. Le dessous des ailes est parcouru dâ€™une large bande blanche caractÃ©ristique de lâ€™espÃ¨ce. La queue est car EspÃ¨ce principalement europÃ©enne, lâ€™OcÃ©anite tempÃªte niche dans lâ€™est de lâ€™Atlantique Nord, des Canaries Ã en passant par les Ã®les britanniques, ainsi que dans la MÃ©diterranÃ©e. Les nicheurs de lâ€™Atlantique sont de grands migrateurs qui passent lâ€™hiver du large de lâ€™Afrique de lâ€™Ouest Ã lâ€™Afrique australe, tandis que les oiseaux mÃ©d semblent plus sÃ©dentaires et hivernent pour partie au moins en MÃ©diterranÃ©e. Lâ€™OcÃ©anite tempÃªte se nourrit en surf attrapant des alevins ou des petits poissons, ainsi que des crustacÃ©s, des mollusques cÃ©phalopodes ou parfois des dÃ©bris organiques gras. La pÃ©riode de reproduction sâ€™Ã©tend de fin avril Ã octobre.

Observation dans le golfe de Gascogne :
Il sâ€™agit de lâ€™espÃ¨ce dâ€™ocÃ©anite la plus commune dans le golfe de Gascogne, oÃ¹ elle est prÃ©sente principaleme novembre, avec une abondance maximale dâ€™aoÃ»t Ã octobre. Il existe des colonies sur le pourtour du golfe de Gascogne : Pays basque, Bretagne et Ã®les britanniques. Lâ€™OcÃ©anite tempÃªte suit rÃ©guliÃ¨rement les bateaux de pÃªche, mais il semble craindre les plus grands, et ne sâ€™approche guÃ¨re des ferrys. Sa petite taille le rend vraiment difficile Ã observer, surtout sur une mer agitÃ©e.