

# Une baleine dans la Tamise (Londres)

Soumis par Helene PELTIER  
19-01-2006

Personne n'a pu rater l'événement. Télévisions, radio, journaux, tout le monde a été informé du triste sort de la baleine de la Tamise (je n'invente rien !).

## RETOUR SUR LES FAITS

Jeudi 19 janvier 2006, un cétacé non identifié est observé dans la Tamise, en plein cœur de Londres. Dans l'absolu, phénomène n'est pas exceptionnel, puisqu'on recense environ 300 cas de mammifères marins perdus dans la Tamise chaque année. L'événement provient du fait que ce cétacé est considérablement plus gros que les marsouins régulièrement observés.

Les premiers rapports font référence à un globicephale noir. L'espèce est présente en Manche et en mer du Nord. L'identification est presque plausible.

Le 20 janvier, la BDMLR (British Divers Marine Life Rescue Office) est contactée pour secourir le « globicephale ». Une experte de la Marine Connection trouve le cétacé et l'identifie comme un hyperoodon arctique (*Hyperoodon ampullatus*, ou baleine à bec commune). Cette espèce n'a bien sûr rien à faire dans la Tamise, puisque c'est un animal qui plonge très grandes profondeurs pour se nourrir de céphalopodes (calmars!), un peu comme les cachalots. Les hyperoodons se trouvent dans les eaux atlantiques froides à tempérées (des Açores au Svalbard), mais jamais dans des eaux peu profondes, comme la Manche. La baleine s'échoue plusieurs reprises, mais retourne chaque fois à l'eau saine. La presse est alertée, et la foule se rassemble sur les bords de la Tamise.

La BDMLR s'interroge sur la meilleure technique à adopter. Effectivement, tout doit être parfaitement en place avant de débiter la manœuvre!

Quand la décision est prise, la nuit est tombée. Il faudra donc attendre le lendemain.

C'est dans la journée du 21 janvier que l'hyperoodon est placé dans deux grandes bouées gonflables (apparemment sans mal !). Il va ensuite être placé sur une barge pour être transporté hors de l'estuaire de la Tamise.

Les vétérinaires de la Zoological Society of London accompagnent l'animal et effectuent les premiers soins. En fin d'après-midi, la situation se détériore puisque le rythme respiratoire de l'animal descend à 8 respirations par minute. Les inspirations semblent difficiles. Au moment où les vétérinaires prennent la décision de l'euthanasie, l'hyperoodon

## CONCLUSIONS POST-MORTEM

L'animal était bien un hyperoodon de 5.85 mètres et de quelques tonnes. C'était une femelle juvénile de moins de 5 ans, et n'ayant pas atteint sa maturité sexuelle.

L'autopsie révèle que la mort était due à la combinaison de trois facteurs : déshydratation, insuffisance rénale et

dommages musculaires, l'un ayant probablement entraîné les deux autres. En effet, rappelons que les mammifères marins n'ont que leurs proies comme sources d'eau douce, eau issue du métabolisme des graisses. Dans des eaux profondes, l'animal n'a pas du trouver de nourriture. On ne sait pas depuis combien de temps la baleine errait dans la Manche, mais quelques jours sans se nourrir peuvent suffire à la déshydratation ! triste ironie pour des animaux vivants dans l'eau ! De plus, les reins jouent un rôle capital chez les mammifères marins, puisqu'ils contribuent très largement à l'excrétion de l'excédent de sel que ces animaux absorbent.

On comprend mieux, après coup, pourquoi l'hyperoodon n'a pas pu survivre à son séjour en eau douce.

Reste la question du pourquoi de la chose, que faisait un animal adepte des grands fonds dans l'estuaire de la Tamise ?

On trouve à ce sujet les hypothèses les plus variées. Voici celle qui a été avancée par le vétérinaire qui a réalisé l'autopsie le Dr Paul Jepson. L'animal est entré par erreur dans la mer du nord. Son instinct, l'incitant à retrouver les grands fonds atlantiques, l'aurait poussé à continuer sa route vers l'ouest, et le fit entrer dans la Tamise.