Marsouin commun - Phocoena phocoena

Soumis par Nathalie TAPIE
21-10-2007

Ordre : CÃ©tacÃ©s

Sous-Ordre : OdontocÃ¨tes

Famille : PhocoenidÃ©s

Noms Vernaculaires : Marsouin Commun, Pourcil, Marsouin des rades

Nom latin : Phocoena phocoena

GB : Harbour porpoise / GER : Schweinswal /Â ITA : Focena, Marsuino /Â SPAIN : Marsopa comÃºn /Â CZECH : SviHucha obecnÃ¡ /Â DANISH : Marsvin /Â DUTCH : Bruinvis / NORWEGIAN : Nise /POLISH : MorswinÂ / SWEDISH : Tumlare

Longueur : 1,4 Ã 1,9 mÃ¨tres au maximum

Poids : Entre 50 et 85 kg

Nourriture : Essentiellement des poissons (hareng, maquereau), des petits calmars et des crevettes

LongÃ©vitÃ© : 10 Ã 15 ans en moyenne (La durÃ©e de vie maximale rapportÃ©e est de 24 ans)

Souffle : Court et peu visible mais trÃ¨s sonore

Vitesse maximale de nage : 22 km.h-1.

PlongÃ©e : 2 Ã 6 minutes et jusqu'Ã 8 minutes Profondeur 220 m au maximum

Habitat : Eaux cÃ´tiÃ¨res de l'hÃ©misphÃ¨re nord

Population : Inconnue

Signes particuliers : Reconnaissable par sa nageoire dorsale triangulaire. Sâ€™Ã©carte gÃ©nÃ©ralement des bateaux.

Description

Le marsouin commun est relativement petit et trapu, 1,6 m en moyenne. Le dos et les nageoires sont brun Ã gris foncÃ© les flancs sont plus clair et le ventre blanc. Des stries grisÃ©es courent le long de la gorge jusquâ€™aux nageoires pectorales (formant des sortes de moustaches). La nageoire dorsale est large, triangulaire et peu Ã©levÃ©e. La tÃªte est petite est arrondie sans front ni bec distincts. On dÃ©nombre en moyenne 25 dents par demi mÃ¢choire.

Comportement

Les Marsouins communs vivent en petits groupes de 2 Ã 10 individus au maximun. Les groupes sont gÃ©nÃ©ralement cÃ´tiers, Ã©voluant sur des fonds de moins de 200m. Ils se hasardent aussi souvent dans les estuaires. L'espÃ¨ce est prÃ©sente dans les eaux cÃ´tiÃ¨res froides de l'hÃ©misphÃ¨re nord, dont la tempÃ©rature nâ€™excÃ¨de pas 16Â°C. Les marso sont discrets, ils sont peu dÃ©monstratifs en surface.

Reproduction

Chez les marsouins communs, la maturitÃ© sexuelle est atteinte vers lâ€™Ã¢ge de 3 Ã 4 ans. La plupart des femelles matures se reproduisent chaque annÃ©e.

La reproduction a lieu entre la fin du printemps et le dÃ©but de lâ€™Ã©tÃ©. Lâ€™ovulation et la conception est limitÃ©es Ã qu semaines durant cette pÃ©riode. La durÃ©e de la gestation est de 11 mois. A la naissance, le petit mesure entre 70 et 90 cm pour un poids de 5 Ã 7 kg.

La lactation dure de 8 Ã 9 mois. Pendant lâ€™allaitement, les jeunes grossissent rapidement et triplent leur poids Ã trois mois, Ã¢ge auquel ils commencent Ã consommer des aliments solides.

Bibliographie

Carwardine Marc, Baleines dauphins et marsouins, Bordas, 1996, 256.

Hadoram Shirihai, Jarret Brett, Whales dolphins and seals, A&C Black Publishers, 2006, 384 p.

Cresswell Graeme, Walker Dylan, Whales & Dolphins of tre European Atlantic, Wild guides, 56 p.

COSEPAC 2003. Ã‰valuation et Rapport de situation du COSEPAC sur le marsouin commun (Phocoenaphocoena) (population de lâ€™Atlantique Nord-Ouest) au Canada â€“ Mise Ã jour . ComitÃ© sur le statut des espÃ¨ces en pÃ©ril au Cana Ottawa. vii + 35 p.