Puffin fuligineux *Puffinus griseus*

Soumis par Eric GARLETTI
04-07-2010

Puffin fuligineux " *Puffinus griseus*

Famille : Procellariidés

Nom vernaculaire : Puffin fuligineux

Nom scientifique : *Puffinus griseus*

SPAIN : Pardela Sombria " GB : Sooty Shearwater

Longueur : 40 " 50 cm

Envergure : 93 " 106 cm

Poids : 800 g

Nourriture : poissons et autres petits animaux marins.

Habitat : Pacifique, fréquente la haute mer et niche sur des îles ou des côtes inhabitées.

{youtube}i_8wYccNmZU{/youtube}

Puffin de assez grande taille, le Puffin fuligineux se distingue des autres espèces par sa coloration brun suie qui lui a valu son nom. Seul le dessous des ailes est parcouru d'une bande gris argentée. Ses ailes très longues et fines lui assurent un vol particulièrement rapide. Comme le Puffin majeur, il niche dans l'hémisphère austral. En dehors de la saison de reproduction, les individus remontent dans le Pacifique pour les uns, l'Atlantique pour les autres, effectuant des migrations en boucle à travers les océans. Une récente étude (Shaffer et al. 2006) a démontré que les individus nichant en Nouvelle Zélande effectuaient une migration en forme de 8 à travers le Pacifique, exploitant au mieux ressources alimentaires et vents dominants. Des oiseaux, équipés de balises électroniques permettant de les localiser grâce à des satellites, ont effectué un trajet d'environ 65 000 km chacun à travers le Pacifique en dehors de la saison de reproduction avec des trajets journaliers pouvant dépasser 900 km. Il s'agit d'une des plus grandes migrations animales jamais enregistrées. Les oiseaux de l'Atlantique, qui nichent au sud de l'Amérique du Sud, remontent le long des côtes américaines après la reproduction. Parvenus au nord de l'Atlantique, ils effectuent une boucle comme les Puffins majeurs. Sur la route du retour vers l'Atlantique Sud, ils passent alors au large des côtes européennes en fin d'été.

Observation dans le golfe de Gascogne :

Le Puffin fuligineux fréquente le golfe de Gascogne de juin à novembre, avec une présence maximale en septembre. Sa silhouette et sa coloration peuvent entraîner des confusions avec les Puffins des Baléares les plus sombres, ainsi qu'avec les labbes.