Mouette pygmee Larus minutus

Soumis par Eric GARLETTI
04-07-2010

Mouette pygmÃ©e â€“ Larus minutus

Famille : LaridÃ©s

Nom vernaculaire : Mouette pygmÃ©e

Nom scientifique : Larus minutus

SPAIN : Gaviota Enana â€“ GB : Little Gull

Longueur : 24 â€“ 28 cm

Envergure : 62 â€“ 69 cm

Poids : 85 â€“ 150 g

Nourriture : poissons et invertÃ©brÃ©s capturÃ©s Ã la surface de lâ€™eau.

Habitat : Niche dans les marais mais frÃ©quente le littoral et la pleine mer aprÃ¨s la pÃ©riode de reproduction.

{vimeo}6296446{/vimeo}

La Mouette pygmÃ©e est la plus petite reprÃ©sentante de sa famille. Sa silhouette est particuliÃ¨re. Elle possÃ¨de un bec fin et dÃ©licat. Le corps est plutÃ´t rondouillard. Les ailes sont longues mais arrondies Ã leur extrÃ©mitÃ©. Lâ€™adulte est blanc, un manteau gris pÃ¢le et le bout des ailes blanc. Le dessous des ailes est typiquement noirÃ¢tre, trait caractÃ©ristique de lâ€™espÃ¨ce. Les pattes sont petites et rouges. En plumage nuptial (printemps), la tÃªte est couverte dâ€™un capuchon noir. E plumage immature, des marques noires forment un W sur les ailes, caractÃ¨re partagÃ© par la Mouette tridactyle et la Mouette de Sabine au mÃªme Ã¢ge.

Â AprÃ¨s sâ€™Ãªtre reproduite dans des marais dâ€™eau douce, la Mouette pygmÃ©e part en migration vers la mer. Les indivi hivernent gÃ©nÃ©ralement sur le littoral ou en pleine mer, surtout dans le bassin mÃ©diterranÃ©en et le long des cÃ´tes atlantiques de lâ€™Europe de lâ€™Ouest. En mer comme sur les marais dâ€™eau douce, la Mouette pygmÃ©e se nourrit de p animaux (invertÃ©brÃ©s, petits poissons) capturÃ©s Ã la surface de lâ€™eau. Sa technique de pÃªche rappelle celle des guife Elle se dÃ©place dâ€™un vol lÃ©ger et capricieux, picorant de minuscules animaux en surface sans se poser. En hivernage ou en migration, elle est parfois observÃ©e en grandes troupes.

Observation dans le golfe de Gascogne :

Le golfe de Gascogne est un lieu dâ€™hivernage important pour lâ€™espÃ¨ce. Les observations ont lieu entre septembre et avr avec une concentration plus marquÃ©e de janvier Ã avril. Si lâ€™on sait que de nombreux individus passent lâ€™hiver dans le secteur, il reste encore des zones dâ€™ombre sur leur rÃ©partition au sein du golfe de Gascogne en fonction des annÃ©es.