Mouette tridactyle Rissa tridactyla

Soumis par Eric GARLETTI
04-07-2010

Mouette tridactyle â€“Rissa tridactyla

Famille : LaridÃ©s

Nom vernaculaire : Mouette tridactyle

Nom scientifique : Rissa tridactyla

SPAIN : Gaviota tridactila â€“ GB : Black-legged Kittiwake

Longueur : 37 â€“ 42 cm

Envergure : 93 â€“ 105 cm

Poids : 340 â€“ 500 g

Nourriture : poissons, et secondairement dâ€™autres petits animaux marins, pÃªchÃ©s en mer.

LongÃ©vitÃ© : jusquâ€™Ã 18 ans

Habitat : PÃ©lagique, frÃ©quente la haute mer et niche sur les cÃ´tes.

{youtube}f1XgifbCUqM{/youtube}Mouette tridactyle sur une plage du parc de Miribel-jonage, prÃ¨s de Lyon aprÃ¨s la tempÃªte en janvier 2009

Â

La Mouette tridactyle est un des oiseaux marins les plus caractÃ©ristiques en Europe du Nord. LÃ©gÃ¨rement plus grande quâ€™une Mouette rieuse, elle sâ€™en distingue par la pointe des ailes noire, comme trempÃ©e dans de lâ€™encre, le bec jau les pattes noires. En plumage nuptial, la tÃªte est entiÃ¨rement blanche. Les parties supÃ©rieures, dos et dessus des ailes, sont grises. Le corps, la queue et le dessous des ailes sont blancs. Les jeunes oiseaux portent des marques noires sur les ailes qui forment un W caractÃ©ristique.

Â Contrairement Ã de nombreuses espÃ¨ces de mouettes et de goÃ©lands, qui frÃ©quentent plutÃ´t le littoral, la Mouette tridactyle est une vraie pÃ©lagique. Elle passe lâ€™hiver en pleine mer, oÃ¹ elle recherche en groupe les bancs de petits poissons. Ils forment lâ€™essentiel de son rÃ©gime alimentaire, mais elle peut Ã©galement capturer des petits crustacÃ©s ou d mollusques. Ces proies sont prises en surface ou bien Ã lâ€™occasion de brefs plongeons. En pÃ©riode de reproduction, la Mouette tridactyle niche sur les cÃ´tes, principalement dans le nord de lâ€™Europe, en Arctique et sur les cÃ´tes canadiennes. Les oiseaux installent leurs nids sur des falaises abruptes, formant des colonies parfois trÃ¨s nombreuses. Ils sâ€™installent aussi dans les ports, construisant leurs nids sur des bÃ¢timents.

Observation dans le golfe de Gascogne :

Quelques colonies de Mouettes tridactyles se trouvent sur le pourtour du golfe de Gascogne, de la Bretagne Ã la VendÃ©e. Ces colonies, plutÃ´t petites et peu nombreuses, sont frÃ©quentÃ©es dâ€™avril Ã aoÃ»t. Mais câ€™est lors de la migration et lâ€™hivernage que lâ€™espÃ¨ce est la plus abondante dans le golfe de Gascogne, de nombreux individus nordiques arrivant Ã ces pÃ©riodes lÃ . Les plus fortes densitÃ©s sont ainsi notÃ©es de novembre Ã fÃ©vrier.